

INFOS VETO



CLINIQUE VETERINAIRE DE LA HAINAUD

**.CLINIQUE VETERINAIRE DE LA HAINAUD
Drs AERTS, JACOB, LAUGUEUX, VILLEVAL**

Rue Alain Colas


53 500 ERNEE

Tel : 02-43-05-11-32



Le coin botanique

A cette période de l'année, il faut renforcer la saveur de l'organe foie vésicule biliaire. Mettez un peu de vinaigre dans l'alimentation pour que le changement de saison se déroule le mieux possible. Demander nous conseils au besoin.



Le coin ostéopathie


Vache et génisse infertiles

Elles n'ont pas été vues en chaleur, Elles n'ont pas répondues aux traitements hormonaux, ou ont été inséminées plusieurs fois régulièrement sans succès, il peut être intéressant de les voir en ostéopathie, une dysfonction crânienne, lombaire ou du bassin peut en être l'origine. Plusieurs études ont été publiées avec des résultats positifs entre 70 et 80 %. Intérêt également en prévention avant la mise à la repro, notamment pour des récalcitrantes connues d'avance.



PINCE A LEVER

Plusieurs pinces à lever, sont toujours dans vos exploitations, nous vous rappelons qu'il s'agit d'une location courte durée et non un prêt définitif. Merci de nous les ramener lorsque vous n'en avez plus besoin. Pensez à vos collègues. Merci d'avance.



FORMATION PRATIQUE : ECORNAGE

2 mai de 10h à 12h

Lieu restant à définir

Petit groupe 5 à 8

INTERETS :

- respect des chartes de bonnes pratiques
- anesthésie du nerf cornual (nerf de la corne) pour un écornage sans douleur instantanée et réduite à moyen terme

Comment bien se préparer pour une chirurgie ?



TABLE STABLE PROPRE

TORCHONS PROPRES

SEAUX PROPRES INTERIEUR EXTERIEUR

Donner les meilleures chances à votre vache de ne pas souffrir d'infections chirurgicales :

- Hygiène du bovisol, du portail à césarienne (nettoyer et désinfecter après chaque intervention, et conserver propre)

- Hygiène du poste de travail :
 - 2 à 3 seaux propres à l'intérieur ET à l'extérieur, idéalement en conserver à l'écart pour ça.

- 5 torchons propres gardés dans un sac plastique ou une boîte fermée pour éviter les poussières

- 1 table propre ET stable, > 1m x 60 cm

- 1 ficelle pour attacher la queue

- NE PAS "pailler la vache" avant notre intervention, trop de poussière présentes
- Pour une césarienne : 2 lacs de vêlage propres (conservés dans une boîte ou un sac propre)

Désinfection des surfaces.

Règle de base :

En présence de matière organique l'efficacité d'un désinfectant est réduit de 50% **ON NE PEUT DESINFECTER QUE DES SURFACES PROPRES.**

✓ 1ère étape le nettoyage. L'utilisation d'un détergent permet d'éliminer le



biofilm incrusté qui peut renfermer les germes. L'eau glisse sur le support le détergent tensioactif permet



de rentrer au fond des anfractuosités.


Temps de contact : 30 min (45 si caillebotis), à adapter en fonction de la saison, il ne faut pas que ça sèche.

✓ 2ème étape : laisser sécher 2h

✓ 3ème étape : appliquer un désinfectant et ne pas le rincer. Molécules efficaces : Dérivés phénolés, amonium quaternaire, aldéhyde, amine.

CALCUL DE DOSE pour 10 m²

$$\text{Quantité de produit (en litres)} = \text{Surface développée (m}^2\text{)} \times \text{Quantité d'eau (L)} \times \text{\% produit utilisé}$$



$$250 \text{ m}^2 \times 0.2 \text{ L / m}^2 \times 0.02 = 5 \text{ L eau} + 100 \text{ ml de détergent à 2\%}$$